

ด้วงก้นกระดก

ด้วงก้นกระดก *Paederus fuscipes* Curtis ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร โคนหนวดสีน้ำตาลแดง ส่วนปลายสีน้ำตาลดำ มีขนตามปล้องหนวด หัวแบนสีดำ ออกส่วนหน้าแบนยาว สีน้ำตาลไหม้ ปีกสีดำและมีขนสั้นๆ ขาทั้ง 3 คู่ สีน้ำตาลแดง ส่วนท้องมี 6 ปล้อง 4 ปล้องแรกสีน้ำตาล ส่วนที่เหลือสีดำ บินเร็วและว่องไว เวลาวิ่งจะยกปลายท้องตั้งขึ้นคล้ายแมงป่องจนเรียกว่า "ด้วงก้นกระดก" เป็นตัวห้ำของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่น หนอนและดักแด้หนอนผีเสื้อกินใบ และไข่ของหนอนกอ พบทั่วไปในนาข้าว ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าว เป็นแมลงที่มีอายุอยู่ได้ยาวนาน มีความว่องไว ไต่ไปตามต้นข้าว และบินได้



ตัวเต็มวัยด้วงก้นกระดก



ลักษณะการห้ำเหยื่อ

ด้วงดิน

ด้วงดิน *Ophionea ishii ishii* Habu ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร หนวดยาว ปลายหนวดมีสีน้ำตาลดำเข้ม ออกส่วนหน้ายาวกลมลักษณะคล้ายคอกมีสีน้ำตาลแดง โคนขาทั้ง 3 คู่ สีน้ำตาล โคนปีกสีดำ คาดต่อด้วยสีน้ำตาลแดง และมีคาดดำอีก 1 แถบ ปลายปีกมีสีน้ำตาลแดง บริเวณแถบคาดดำที่ 2 จะมีรอยจุดขาวที่ปีก ข้างละ 1 จุด ตัวอ่อนมีเขี้ยวเหมือนตัวเต็มวัย ใช้จับเหยื่อ

ด้วงดินเป็นตัวห้ำของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่น หนอนและดักแด้ของผีเสื้อกินใบ ไข่ผีเสื้อหนอน หนอนและ ดักแด้แมลงบัวเป็นต้น พบทั่วไปในนาข้าวตั้งแต่ข้าวยังเล็ก มีนิสัยว่องไว บินและไต่ไปตามต้นข้าวทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพื่อหาเหยื่อ



ตัวเต็มวัยด้วงดิน



ลักษณะการห้ำเหยื่อของด้วงดิน

เอกสารความรู้ fact sheet



